

Số: /UBND-ĐCNN

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023

Về hướng dẫn bón đón đòng và
phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa

Kính gửi: Các ông, bà trưởng các thôn.

Cây lúa sinh có 3 giai đoạn chính: Giai đoạn đẻ nhánh rộ- cuối đẻ nhánh- đứng cái, làm đòng. Trong thời gian qua do việc chăm sóc, bón phân lai rai và thời tiết nắng nóng chuyển sang âm u, có mưa. Đây là điều kiện thuận lợi cho dòi đục nõn, bệnh đạo ôn lá phát sinh, phát triển và gây hại. UBND xã Quang Trung hướng dẫn biện pháp bón đón đòng và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại như sau:

I. Chăm sóc (bón đón đòng):

Là khi trên ruộng lúa có 10% số lá thắt eo. Nếu lúa phát triển kém bón bổ sung thêm phân đạm, lượng phân bón như sau:

* Đối với phân đơn:

- Phân đạm urê: 1 - 2 kg/ sào.

- Kali clorua: Lúa lai 5 - 7 kg/sào; lúa thuần 4 - 6 kg/sào

* Đối với bón phân NPK tổng hợp nên chọn loại có tỉ lệ Kali cao như: NPK (12.3.10, 16.8.16, 13.3.10), đầu trâu TE 02. Lượng bón theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

II. Tình hình sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ

1. Tình hình sâu bệnh hại:

- Dòi đục nõn gây hại trung bình đến nặng trên diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ- cuối đẻ nhánh đối với ruộng bón phân lai rai, bón muộn và bón thừa đạm.

- Bệnh đạo ôn lá xuất hiện và gây hại nhẹ đến trung bình, trên các giống nhiễm như TBR225, nếp.... Tỉ lệ hại trung bình từ 2-5%, nơi cao 10%.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm xuất hiện với mật độ thưa, gây hại nhẹ.

- Chuột gây hại nhẹ những khu ruộng ven làng, gần gò, đồi, ...

2. Dự kiến sâu bệnh hại

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên một số giống nhiễm như Nếp, TBR225, Bắc Thịnh, Q5, Thái Xuyên 111,... tại các chân ruộng bón phân không cân đối, nhất là bón thừa đạm, những diện tích đã bị không được phun trừ kịp thời.

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 ra rộ từ ngày 30/3/2023 đến ngày 03/4/2023, sâu non lứa 3 nở rộ từ ngày 4/4/2023 đến ngày 18/4/2023 có khả năng gây hại cục bộ trên các diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ- đứng cái.

- Chuột tiếp tục gia tăng và gây hại nặng, đặc biệt lúa giai đoạn làm đòng.

3. Biện pháp phòng trừ

*** Dòi đục nõn:**

Phun phòng trừ khi tỷ lệ hại từ 20% trở lên. Sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học như Emamectin,

*** Bệnh đạo ôn lá:**

- Trên diện tích đã xuất hiện vết bệnh dùng bón phân, đặc biệt là phân Đạm và phun các loại phân bón qua lá. Đảm bảo mực nước trên ruộng 3 - 5cm.

- Sử dụng loại thuốc trừ bệnh ngay bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Propiconazole, Fenoxanil, Tricyclazole,... cụ thể một số loại thuốc như Kasoto 200 SC, Kabin 30 WP, Angate 75WP, Bump 650 WP, Bankan 600 WP,... nếu áp lực bệnh cao có thể phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 3-5 ngày, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.

- Sau phun thuốc khi bệnh ngừng phát triển mới được bón phân và luôn giữ đủ nước trong ruộng.

*** Chuột hại:** Sử dụng các biện pháp thủ công như đào hang, đánh bẫy bả, sử dụng các thuốc trừ chuột sinh học,...

*** Sâu cuốn lá nhỏ:** Tiến hành phòng trừ khi mật độ sâu non:

Giai đoạn đẻ nhánh: 50 con/m².

Giai đoạn đứng cái: 20 con/m².

Đối với các diện tích có xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ. Phun phòng trừ sâu từ ngày 3/4- 8/4/2023. Sử dụng thuốc trừ sâu như: Rholam 20EC; Prevathon 5SC; Clever 30WG...

Để phun trừ bệnh có hiệu quả cao cần phun lượng nước thuốc đã pha là 25-30 lít/Sào và thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng (Đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng kỹ thuật).

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV cần thu gom bảo gói tập trung đúng nơi quy định để tiêu hủy.

Trên đây là những biện pháp kỹ thuật chăm sóc và bón đón đòng cho cây lúa vụ Chiêm xuân năm 2023. UBND xã yêu cầu các ông, bà trưởng các thôn tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng kỹ thuật và kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND xã (B/c);
- CC Văn Hóa (Tuyên truyền);
- Trưởng 6 thôn (T/h)
- Lưu: VP, ĐC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Văn Thông

