

Số: /UBND-ĐCNN Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2024

V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh  
cuối vụ chiêm xuân năm 2024.

Kính gửi: Các ông, bà trưởng các thôn.

Trong giai đoạn vừa qua, do điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, đêm có mưa, ngày nắng nóng. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh xuất hiện gây hại đặc biệt là rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân bướm 2 chấm, bệnh bạc lá, chuột,... phát sinh gây hại và có thể bùng phát mật độ, tỷ lệ cao vào cuối vụ, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng lúa vụ Chiêm Xuân. UBND xã thông báo, hướng dẫn phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ chiêm xuân 2024 như sau:

Tăng cường thăm đồng, phân loại các trà lúa, giống lúa có nguy cơ nhiễm bệnh. Quan tâm đến các đối tượng như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ trên trà muộn, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá,... trên các chân ruộng, loại giống có nguy cơ cao.

Các biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính:

**1- Rầy nâu, rầy lưng trắng:** Diễn biến phức tạp, có sự gổi lúa rầy trưởng thành lúa 2 và rầy non lúa 3: MĐPB 30-50 con/m<sup>2</sup> , cao 200 - 300 con/m<sup>2</sup> , cục bộ 1000 con/m<sup>2</sup> , cá biệt 2000 con/m<sup>2</sup>.

Trên trà lúa ôm đồng nếu mật độ từ 1.500 con/m<sup>2</sup> cần sử dụng một trong các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như: Pymetrozine; Acetamiprid + Imidacloprid; Lambda-cyhalothrin +Thiamethoxam,... để phun trừ.

Trên trà lúa bắt đầu trở đến chắc xanh, khi mật độ từ 1.000 con/m<sup>2</sup> trở lên phun trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất tiếp xúc như: Fenobucarb, Nitenpyram, Buprofezin,...

**2- Sâu cuốn lá nhỏ:** Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 vũ hóa trưởng thành rộ 23 - 25/4/2024, sâu non lúa 3 nở rộ từ 30/4 - 05/5/2024, khả năng mật độ sẽ cao và gây hại cục bộ trên lúa trà muộn giai đoạn đòng non.

Mật độ sâu từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên đối với lúa giai đoạn ôm đồng đến trở bông, khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-3). Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau Clever 105 SC, Voliam Targo 630SC, Prevathon 5 SC, ...

Ngoài ra đối với diện tích lúa trở gặp điều kiện thời tiết bất lợi, vùng có nguy cơ cao, cần kết hợp phun phòng bệnh đen lép hạt bằng các loại thuốc có

hoạt chất như Tricyclazole, Trifloxystrobin + Tebuconazole, Isoprothiolane,...để phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt.

**Lưu ý:** Cần sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định với vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng.

Trên đây là những nội dung hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cuối vụ Chiêm Xuân 2024. UBND xã đề nghị các ông, bà trưởng các thôn tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời./.

***Nơi nhận:***

- UBND xã (B/c);
- CC Văn hóa (Tuyên truyền);
- Trưởng 6 thôn (T/h);
- Lưu: VP, ĐC.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đào Văn Thông**

